


Ab 6  
Monaten



## Andickungsmittel BEI DYSPHAGIE UND REFLUX BEI SÄUGLINGEN UND KLEINKINDERN

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

### Produkteigenschaften

- Einziges Andickungsmittel speziell auf die Bedürfnisse von Säuglingen angepasst
- Amylase-resistent: Behält stabile Konsistenz für sicheres Schlucken
- Andickung verschiedener Flüssigkeiten möglich, auch proteinreiche Flüssigkeiten wie z.B. Muttermilch
- Erreicht alle vier Andickungsstufen für Flüssigkeiten nach IDDSI Standard
- Geschmacksneutral
- Glutenfrei
- Lactosefrei

### Kontraindikation

- Nekrotisierende Enterokolitis

### Verwendungszweck

Ermöglicht schnelles Andicken von Flüssigkeiten. Zum Diätmanagement bei Reflux und Dysphagie und zur Unterstützung von Schlucktraining.

### Dosierung

Siehe Dosierungstabelle.

### Lagerung

Kühl und trocken lagern. Dose nach Gebrauch wieder verschließen. Nach Anbruch Doseninhalt innerhalb von 8 Wochen aufbrauchen.

### Nährstoffe

#### FETT:

Das Produkt ist fettfrei (0% kcal)

#### KOHLENHYDRATE:

Maltodextrin

#### EIWEISS:

Der Eiweißanteil ist mit 0,5 g / 100 g sehr gering

#### BALLASTSTOFFE:

Besonderes Verhältnis von Johannisbrotkernmehl zu Xanthan von 10:1

### Hinweis

- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet
- Geeignet ab 6 Monaten

## Nährwertinformation

THICKENUP® JUNIOR		100 g	2,5 g
<b>BRENNWERT</b>			
	kJ	1514	38
	kcal	362	9,0
<b>Fett (0% kcal), davon</b>	g	0	0,0
– gesättigte Fettsäuren	g	0	0
<b>Kohlenhydrate (94% kcal), davon</b>	g	85	2,1
– Zucker	g	6,0	0,15
– Lactose	g	<0,010	-
<b>Ballaststoffe (5% kcal)</b>	g	9,1	0,23
<b>Eiweiß (1% kcal)</b>	g	0,50	0,012
<b>Salz</b>	g	0,105	0,0030
<b>MINERALSTOFFE</b>			
Natrium	mg	42	1,05

## Zutatenliste

Maltodextrin, Johannisbrotkernmehl, Xanthan.

## Dosierungsempfehlung

Stufe	Gestrichene Messlöffel (2,5 g pro 100 ml)
Stufe 1 – Leicht Dickflüssig	1
Stufe 2 – Mäßig Dickflüssig	2
Stufe 3 – Stark Dickflüssig	3
Stufe 4 – Extrem Dickflüssig	5

Gewünschte Konsistenz (nach IDDSI Standard). Dosierung mit 100 ml Wasser\* bei Zimmertemperatur (20 – 22 °C).

**ACHTUNG:** Bereiten Sie das ange dickte Getränk frisch zu und füttern Sie dieses sofort. Produktreste nicht wiederverwenden. Die maximale Verzehrsmenge sollte 40 Messlöffel/Tag nicht übersteigen.

\* Ergebnisse bei Verwendung von Leitungswasser können je nach Region variieren. Für die Verwendung des Produkts mit anderen Flüssigkeiten (z.B. Milch) oder die Anwendung nach IDDSI Standard besuchen Sie uns auf [www.thickenupjunior.com](http://www.thickenupjunior.com) oder fragen Sie Ihren Arzt. Es liegt in der Verantwortung der verabreichenden Person, für eine geeignete Konsistenz der Flüssigkeit mit ThickenUp® Junior zu sorgen.

## Bestellinformation

	Art.-Nr.	PZN Stk. (250 g Dose)	PZN VE (12 x 250 g Dose)
250 g Dose	12451739	16622695	16754273

# ThickenUP® Junior



Nestlé Health Science  
(Deutschland) GmbH  
Lyoner Straße 23  
D-60528 Frankfurt  
[www.nestlehealthscience.de](http://www.nestlehealthscience.de)

### Hinweise:

Allergene sind in den Zutatenlisten unterstrichen!